

NOTE

Les éléments présentés ici sont quelques pistes de solution simplifiées. Puisque chaque ferme est unique, il est fortement recommandé de toujours consulter un conseiller en nutrition et d'évaluer l'impact économique de chaque changement appliqué.

*** Ce groupe d'acides gras peut être influencé par une supplémentation en acides gras.

ÉLEVÉS

- Normal si les vaches viennent de sortir au pâturage ou consomment de grandes proportions d'herbe / ensilage d'herbe.
- Dans toute autre situation: **ATTENTION !!!!**
Il y a peut-être un excès de gras dans la ration (huiles, fèves, ...) ou une importante mobilisation des réserves corporelles.




LÉGÈREMENT BAS

- Souvent observé dans les troupeaux à forte teneur en ensilage de maïs.
- Revalider avec les **de novo**.

**Si vous êtes satisfaits des performances, ne changez rien.*

TRÈS BAS

- Frôle la moyenne des mixtes.
- Les vaches semblent manquer d'acides gras dans leur alimentation.
- Valider la consommation totale et le type d'aliments servis pour assurer assez d'acides gras essentiels à la vache.



LÉGENDE

Courbe foncée – Votre troupeau

Courbe pâle – La moyenne

*Les acides gras sont illustrés en Base Lait