



# PLAN BÁSICO DE ALIMENTACIÓN LÁCTEA

DÍA	TIPO DE LECHE	CANTIDAD	
		RAZAS GRANDES	RAZAS PEQUEÑAS
< 6 h	Calostro (Primer ordeño, Brix > 21)	3 - 4 litros (200 gms IgG)	2 - 3 litros (150 gms IgG)
Entre 12 y 24 horas	Calostro o leche de transición (1 <sup>er</sup> o 2 <sup>o</sup> ordeño, Brix > 21)	2 - 3 litros (100 gms IgG)	2 litros (100 gms IgG)
2 <sup>o</sup> y 3 <sup>o</sup>	Leche de transición (Del 2 <sup>o</sup> al 6 <sup>o</sup> ordeño)	6 litros/día	4 litros/día
4 <sup>o</sup> al 7 <sup>o</sup>	Leche o lactoreemplazador	Aumentación gradual hasta $\geq$ 8 litros/día	Aumentación gradual hasta $\geq$ 6 litros/día
8 <sup>o</sup> al 42	Leche o lactoreemplazador	$\geq$ 8 litros/día	$\geq$ 6 litros/día
43 al 49	Leche o lactoreemplazador	6 litros/día	4 litros/día
50 al 63	Leche o lactoreemplazador	Disminuir de 1 litro cada 2 días	Disminuir de 1 litro cada 2 días

## Notas:

- La cantidad de calostro a dar en las dos primeras tomas o comidas puede ser ajustado según su calidad, esto con el fin de llenar los requerimientos de Inmunoglobulinas G recomendadas.
- Se recomienda dar más de dos tomas cuando se dan 6 litros de leche o más por día.
- Se recomienda destetar el ternero en el momento que éste consume 2 kg/día de concentrado.
- Al final del destete cuando el ternero consume 2 litros de leche por día, es mejor dar una toma de 2 litros que dos tomas de 1 litro.



# PLAN DE ALIMENTACIÓN LÁCTEA A VOLUNTAD

DÍA	TIPO DE LECHE	CANTIDAD	
		RAZAS GRANDES	RAZAS PEQUEÑAS
< 6 h	Calostro (1 <sup>er</sup> ordeño, Brix > 21)	3 - 4 litros (200 gms IgG)	2 - 3 litros (150 gms IgG)
Entre 12 y 24 horas	Calostro o leche de transición (1 <sup>er</sup> o 2 <sup>o</sup> ordeño, Brix > 21)	2 - 3 litros (100 gms IgG)	2 litros (100 gms IgG)
2 <sup>o</sup> y 3 <sup>o</sup>	Leche de transición (Del 2 <sup>o</sup> al 6 <sup>o</sup> ordeño)	4 a 6 litros/día	4 litros/día
4 <sup>o</sup> al 7 <sup>o</sup> (14)	Leche o lactoreemplazador	Aumentación gradual hasta 9 litros/día	Aumentación gradual hasta $\geq$ 7 litros/día
8 <sup>o</sup> (15) al 21	Leche o lactoreemplazador	9 litros/día	$\geq$ 7 litros/día
22 al 42	Leche o lactoreemplazador	12 litros/día	9 litros/día
43 al 49	Leche o lactoreemplazador	9 litros/día	7 litros/día
50 al 63	Leche o lactoreemplazador	Disminución de 1 litro por día	Disminución de 1 litro por día

## Notas:

- La cantidad de calostro a dar en las dos primeras tomas o comidas puede ser ajustado según su calidad, esto con el fin de llenar los requerimientos de Inmunoglobulinas G recomendadas.
- Se recomienda dar más de dos tomas cuando se dan 6 litros de leche o más por día.
- Se recomienda destetar el ternero en el momento que éste consume 2 kg/día de concentrado.
- Al final del destete cuando el ternero consume 2 litros de leche por día, es mejor dar una toma de 2 litros que dos tomas de 1 litro.