



PLAN D'ALIMENTATION LACTÉE – DE BASE

JOUR	TYPE DE LAIT	QUANTITÉ	
		GRANDES RACES	PETITES RACES
< 6 h	Colostrum (1 ^{re} traite, Brix > 21)	3 - 4 L (200 g IgG)	2 – 3 L (150 g IgG)
Entre 12 et 24 h	Colostrum ou lait de transition (1 ^{re} ou 2 ^e traite, Brix > 21)	2 - 3 L (100 g IgG)	2 L (100 g IgG)
2 et 3	Lait de transition (Traites 2 à 6)	6 L/j	4 L/j
4 à 7	Lait ou lactoremplacéur	Augmentation graduelle jusqu'à ≥ 8 L/j	Augmentation graduelle jusqu'à ≥ 6 L/j
8 à 42	Lait ou lactoremplacéur	≥ 8 L/j	≥ 6 L/j
43 à 49	Lait ou lactoremplacéur	6 L/j	4 L/j
50 à 63	Lait ou lactoremplacéur	Diminution de 1 L par 2 jours	Diminution de 1 L par 2 jours

Notes:

- La quantité de colostrum à donner pour les deux premiers repas peut être ajustée selon sa qualité pour combler l'apport d'immunoglobulines G recommandé
- Il est recommandé d'offrir plus de deux repas lorsqu'on donne 6 L de lait ou plus par jour
- Il est recommandé de sevrer le veau lorsqu'il consomme 2 kg/j de moulée
- À la fin du sevrage, lorsque le veau consomme 2 L de lait par jour, il est préférable de servir un repas de 2 L plutôt que deux repas de 1 L



PLAN D'ALIMENTATION LACTÉE – PRESQU'À VOLONTÉ

JOUR	TYPE DE LAIT	QUANTITÉ	
		GRANDES RACES	PETITES RACES
< 6 h	Colostrum (1 ^{re} traite, Brix > 21)	3 - 4 L (200 g IgG)	2 - 3 L (150 g IgG)
Entre 12 et 24 h	Colostrum ou lait de transition (1 ^{re} ou 2 ^e traite, Brix > 21)	2 - 3 L (100 g IgG)	2 L (100 g IgG)
2 et 3	Lait de transition (Traites 2 à 6)	4 à 6 L/j	4 L/j
4 à 7 (14)	Lait ou lactoreplaceur	Augmentation graduelle jusqu'à 9 L/j	Augmentation graduelle jusqu'à ≥ 7 L/j
8 (15) à 21	Lait ou lactoreplaceur	9 L/j	≥ 7 L/j
22 à 42	Lait ou lactoreplaceur	12 L/j	9 L/j
43 à 49	Lait ou lactoreplaceur	9 L/j	7 L/j
50 à 63	Lait ou lactoreplaceur	Diminution de 1 L par jour	Diminution de 1 L par jour

Notes:

- La quantité de colostrum à donner pour les deux premiers repas peut être ajustée selon sa qualité pour combler l'apport d'immunoglobulines G recommandé
- Il est recommandé d'offrir plus de deux repas quand on donne 6 L de lait ou plus par jour
- Il est recommandé de sevrer le veau lorsqu'il consomme 2 kg/j de moulée
- À la fin du sevrage, lorsque le veau consomme 2 L de lait par jour, il est préférable de servir un repas de 2 L plutôt que deux repas de 1 L