

Critères minimaux pour une épreuve officielle selon le caractère et le groupe de race

Caractère	Holstein			Ayrshire et Jersey			Guernsey, Suisse Brune, Shorthorn Laitier et Canadienne		
	Filles	Troupeaux	Fiabilité	Filles	Troupeaux	Fiabilité	Filles	Troupeaux	Fiabilité
Production ⁽¹⁾	20	10	70%	20	10	65%	10	5	50%
Cellules somatiques	Si production est officielle			Si production est officielle			Si production est officielle		
Persistance de lactation									
Conformation	20	10	60%	15	10	55%	10	5	40%
Durée de vie	Si conformation est officielle			Si conformation est officielle			Si conformation est officielle		
Vitesse de traite	10	10	55%	10	10	55%	5	5	40%
Tempérament de traite	10	10	55%	10	10	55%	5	5	40%
Fertilité des filles	20	10	45%	20	10	35%	15	5	25%
Aptitude au vêlage ⁽²⁾	50	10	55%	35	10	50%	15	5	35%
Aptitude des filles au vêlage ⁽³⁾	10	10	55%	10	10	50%	10	5	35%
Cote de condition de chair	20	10	60%	15	10	55%	10	5	40%
Résistance à la mammite ⁽⁴⁾	20	10	45%	20	10	35%	Non disponible		
Maladies métaboliques ⁽⁵⁾	20	10	45%	20	10	35%			
Effizienz du méthane	20	5	70%	Non disponible					
Effizienz alimentaire ⁽⁶⁾	5	1	50%						
Besoins de maintenance corporel	20	5	70%						
Santé des onglons ⁽⁷⁾	5	5	70%						
Santé des veaux ⁽⁸⁾	20	5	70%						

Note 1: Le nombre minimal de filles en production est basé sur les filles qui dépassent 90 jours en lait dans toutes les races sauf pour la race Holstein qui est basée sur les filles qui dépassent 120 jours en lait.

Note 2: Le nombre minimal de filles pour l'Aptitude au vêlage est basé sur le nombre minimal de progénitures nées.

Note 3: Une épreuve officielle pour l'Aptitude des filles au vêlage exige aussi une épreuve officielle pour l'Aptitude au vêlage puisque l'Aptitude des filles au vêlage est la somme de l'effet maternel et de la moitié de l'effet direct.

Note 4: Les critères minimaux d'admissibilité à une épreuve officielle pour la Résistance à la mammite sont appliqués à l'évaluation pour la Mammite clinique en première lactation.

Note 5: Les critères minimaux d'admissibilité à une épreuve officielle pour les Maladies métaboliques sont appliqués à l'évaluation pour la Cétose subclinique en première lactation.

Note 6: Le minimum de filles pour l'Effizienz alimentaire réfère aux données de matière sèche ingérée et le minimum de fiabilité est appliqué à l'indice d'Effizienz alimentaire.

Note 7: La fiabilité minimale pour recevoir une évaluation officielle pour la Santé des onglons est appliquée à l'évaluation pour la Dermatite digitale.

Note 8: